

# RATROM BLOCO PROFISSIONAL

## RODENTICIDA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº PT/DGS ARMPB – 25/2015

### Propriedades

Isco pronto a utilizar contendo como ingrediente ativo o anticoagulante Brodifacume, efetivo em ratos domésticos (*mus musculus*), ratos castanhos (*rattus norvegicus*) e ratos pretos ou de telhado (*rattus rattus*) mesmo após uma única ingestão. A formulação consiste num isco em bloco de parafina, particularmente atrativa ao paladar de todas as espécies de roenticidas descritas. O produto não causa desconfiança nos outros roedores. Contém um agente amargante destinado a prevenir a ingestão acidental por crianças. Pode ser usado no interior e em redor de edifícios industriais, rurais ou civis (incluindo armazéns de mercadorias e estaleiros navais), habitações, armazéns, garagens, arrecadações e jardins envolventes.

### Aplicações e Modos de Utilização

#### Interior e exterior em redor de edifícios:

Para o controlo de rato doméstico (*mus musculus*): usar 40g de **RATROM BLOCO PROFISSIONAL** por estação de isco, equivalente a 2 iscos de roenticida prontos a utilizar de 20g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores.

Para o controlo de rato castanho (*rattus norvegicus*) e de rato preto ou de telhado (*rattus rattus*): usar 60-100g de **RATROM BLOCO PROFISSIONAL** por estação de isco, equivalente a 3-5 iscos de roenticida prontos a utilizar de 20g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores.

Quando o uso for exterior, roteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade. Não aplicar este produto diretamente nas tocas. Recarregar o isco quando necessário.

### Composição

100g de produto contém:

- Brodifacume (CAS Nº 56073-10-0): 0.005g;
- Benzoato de Denatónio (CAS Nº 3734-33-6): 0.001g;
- Aromas e Co-formulantes: até 100g.

### Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Cor	Roxo	-
Odor	A alimentos	-





### Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

### Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

### Códigos / Embalagens

Ratrom Raticida Bloco Profissional **8KG** (36078).