

RATROM CEREAL PROFISSIONAL

RODENTICIDA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº PT/DGS ARMPB – 59/2016

Propriedades

Isco pronto a utilizar em grão de base Bromadiolona, efetivo para o controlo de ratos domésticos (*mus musculus*), ratos castanhos (*rattus norvegicus*) e ratos pretos ou de telhado (*rattus rattus*), atractivo ao paladar de todos os roedores habituados a alimentar-se de granulos. A ingestão de uma quantidade suficiente de isco causa a morte dos roedores num intervalo de poucos dias sem criar desconfiança e alarme dos restante membros da comunidade. Isto é obtido graças ao efeito anti-coagulante da substância ativa que causa hemorragias internas letais. Graças ao seu poder atractivo, pode ser usado com eficácia na eliminação de roedores em todos os locais domésticos, civis e industriais (habitações, escritórios, industrias, armazéns de mercadorias e estaleiros navais, etc.), rurais (casas de campo, locais de criação de animais, etc).

Aplicações e Modos de Utilização

Colocar o isco na estação de isco usando um sistema de doseamento:

- Rato doméstico (*mus musculus*): 40g de isco por estação de isco;
- Rato castanho (*rattus norvegicus*) e rato preto ou de telhado (*rattus rattus*): 60-100g de isco por estação de isco.

Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.

Rato doméstico/Ratazanas, interiores

As estações de isco devem ser visitadas para ratos, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias, e para ratazanas, a cada 5 a 7 dias, no início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Rato doméstico/Ratazanas, exteriores em redor de edifícios

Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações. As estações de isco devem ser visitadas para ratos, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias, e para ratazanas, a cada 5 a 7 dias, no início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

Composição

100g de produto contém:

- Bromadiolona (CAS Nº 28772-56-7): 0.005g;
- Benzoato de Denatónio (CAS Nº 3734-33-6): 0.001g;
- Aromas e Co-formulantes: até 100g.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Cor	Vermelho	-
Odor	A alimentos	-





Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Ratrom Raticida Cereal Profissional **5KG** (36087).